

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ!

ПРОФИЛАКТИКА СПИДА

СЕЙЧАС В МИРЕ ЗАРАЖЕНО ВИЧ БОЛЕЕ 40 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК; ПРИ ЭТОМ 80% ВСЕХ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ - МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В ВОЗРАСТЕ ДО 30 ЛЕТ; И ТРИ МИЛЛИОНА - ЭТО ДЕТИ ДО 15 ЛЕТ; В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО БОЛЕЕ 7 ТЫСЯЧ ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ

В 13, 15, 17 лет трудно поверить, что тебе может угрожать смертельная болезнь.

Часто кажется, что болеют и умирают только старые люди. Но со СПИДом все обстоит по-другому. СПИД - это самая серьезная болезнь, с которой приходится сегодня сталкиваться твоим ровесникам во всем мире. Поэтому очень важно знать, как избежать заражения. Получив необходимые знания, ты сумеешь оградить себя от многих серьезных проблем сейчас и в будущем.

СПИД И ВИЧ

СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита. Синдром - это набор определенных проявлений болезни - симптомов. СПИД развивается у людей, заразившихся ВИЧ-инфекцией, и является конечной стадией этой болезни.

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека, он поражает разные клетки организма человека, в первую очередь - иммунной системы. Люди, зараженные ВИЧ, называются «ВИЧ-инфицированными». С момента заражения ВИЧ до развития СПИДа может пройти от 5 до 10 лет. Пока ВИЧ-инфекция не перешла в стадию СПИДа, инфицированный человек может чувствовать себя хорошо, выглядеть здоровым и даже не подозревать, что заражен. Независимо от давности заражения инфицированный человек может передавать ВИЧ другим

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ!

ПРОФИЛАКТИКА СПИДА

Как происходит заражение ВИЧ?

ВИЧ передается только через определенные жидкости организма. Это:

- кровь;
- сперма;
- вагинальный секрет;
- грудное молоко.

Поэтому заразиться можно:

При сексуальных контактах без презерватива. Вирус может передаваться при разных формах сексуальных контактов как разнополых, так и однополых партнеров.

Через кровь. Чаще всего сейчас этот путь реализуется при внутривенном введении наркотиков, когда используются общие шприцы и иглы.

ЗАПОМНИ:
ДЛЯ ЛЮБЫХ ИНЬЕКЦИЙ СЛЕДУЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОДНОРАЗОВЫМ ШПРИЦЕМ

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ!

ПРОФИЛАКТИКА СПИДА



При внутривенном введении наркотиков ВИЧ может передаваться не только через «грязные» шприцы или иглы. Заражению может способствовать:

- приобретение готового раствора наркотика, который в процессе изготовления мог быть инфицирован: если наркотик набирают нестерильными шприцами из общей емкости;
- промывание использованных шприцев в одной общей емкости;
- пользование другими «общими» предметами для приготовления и введения наркотиков: ложки, кружки, ватные тампоны, жгуты и др.;
- ВИЧ может передаваться от инфицированной матери ребенку во время беременности, при родах и во время кормления грудью.

Так как ВИЧ передается с инфицированной кровью, нельзя пользоваться иглами для прокалывания ушей или для нанесения татуировки, если ими уже пользовались другие люди. НЕЛЬЗЯ пользоваться после других людей предметами, которые могут повредить кожный покров. ВСЕГДА нужно мыть